



## ATTESTATION de reprise d'activité en présentiel (volontariat)

Je soussigné(e), \_\_\_\_\_

Salarié de l'EPLEFPA de La Roche sur Yon

- Affirme être volontaire pour reprendre mon activité professionnelles en présentiel à compter du 11 mai 2020
- Atteste avoir pris connaissance des consignes écrites liées aux règles de prévention Covid-19 et m'engage à respecter les mesures de prévention sanitaires mises en place et communiquées au sein de l'EPLEFPA Nature, notamment les gestes barrières, afin de préserver ma santé, celle de mes collègues et de mes proches ;
- Affirme ne présenter aucun symptôme du Covid-19 tels que toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte de goût et d'odorat, maux de tête persistants. Je m'engage à ce titre à informer l'EPLEFPA Nature si l'un de ces symptômes venaient à se déclarer et à ne pas venir travailler ;
- Affirme ne pas avoir été en contact rapproché dans les 14 jours précédant ma date de reprise avec un proche porteur du Covid-19 ou présentant des symptômes laissant penser qu'il pourrait être atteint ; je m'engage à en informer l'EPLEFPA Nature et à ne pas me présenter au lycée si cela devait être le cas et rester en confinement
- J'ai bien noté que je peux revenir sur ma décision de reprise de mon activité professionnelle en présentiel à tout moment.
- Atteste avoir pris connaissance de la liste des personnes à risque : personne enceinte dans leur 3e trimestre de grossesse, en affection de longue durée (ALD) ou au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique ([www.hcsp.fr](http://www.hcsp.fr)). Liste au verso.

Fait à \_\_\_\_\_ Le \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

Signature

## Personnes à risques en sus des personnes en ALD (affections longue durée)

- les personnes âgées de 70 ans et plus ;
- les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- les diabétiques insulino-dépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
- les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;
- les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; les malades atteints de cancer sous traitement.
- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
  - médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,
  - infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm<sup>3</sup>,
  - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
- les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification de Child-Pugh ;
- les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m<sup>2</sup>)
- les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse.

En cas de doute, prenez contact avec votre médecin traitant ou le médecin du travail